

# PROBLEMAS ELÍPTICOS 1D


$$u_{xx} = f(x) \quad ; \quad x \in (a, b) \quad \leftarrow \text{EDP}$$

1) Condiciones de contorno tipo DIRICHLET:

$$\begin{cases} x=a \rightarrow u(x) = u_a \\ x=b \rightarrow u(x) = u_b \end{cases}$$

2) Condiciones de contorno tipo MIXTO (NEUMAN-DIRICHLET):


$$\begin{cases} x=a \rightarrow u_x(x) = u'_a \\ x=b \rightarrow u(x) = u_b \end{cases}$$



Discretización

$$\hat{u}_i \approx u(x_i)$$

$$h = \frac{b-a}{n}$$





## 2) e.c. tipo MIXTO

### 2.1.) En extensión del dominio (sin "puntos fantasma")

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{u(x_{i-1}) - 2u(x_i) + u(x_{i+1}))}{h^2} - \varphi(x_i) + \mathcal{O}(h^2) = 0 \\ \hat{u}_{i-1} - 2\hat{u}_i + \hat{u}_{i+1} - \varphi(x_i) = 0 \end{array} \right.$$

para  $i = 1, \dots, n-1$

e.c:


$$\left\{ \begin{array}{l} [u_x - u'_a] |_{x=x_0} = 0 \\ \rightarrow u_x |_{x=x_0} = \frac{-3u(x_0) + 4u(x_1) - u(x_2)}{2h} + \mathcal{O}(h^2) \\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{-3u(x_0) + 4u(x_1) - u(x_2)}{2h} - u'_a + \mathcal{O}(h^2) = 0 \\ \frac{-3\hat{u}_0 + 4\hat{u}_1 - \hat{u}_2}{2h} - u'_a = 0 \end{array} \right. \\ u(x_n) = u_b \rightarrow \hat{u}_n = u_b \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left[ \begin{array}{cccc|c} -3 & 4 & -1 & & \hat{u}_0 \\ 1 & -2 & 1 & & \hat{u}_1 \\ & 1 & -2 & 1 & \hat{u}_2 \\ & & & 1 & \hat{u}_{n-2} \\ & & & & 1 & \hat{u}_{n-1} \\ & & & & & 0 & 1 & \hat{u}_n \end{array} \right] = \left\{ \begin{array}{l} 2h u'_a \\ h^2 \varphi(x_1) \\ h^2 \varphi(x_2) \\ \vdots \\ h^2 \varphi(x_{n-2}) \\ h^2 \varphi(x_{n-1}) \\ u_b \end{array} \right.$$

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & & & \hat{u}_0 \\ 1 & -2 & 1 & & \hat{u}_1 \\ & 1 & -2 & 1 & \hat{u}_2 \\ & & & 1 & \hat{u}_{n-2} \\ & & & & 1 & \hat{u}_{n-1} \end{array} \right] = \left\{ \begin{array}{l} h u'_a + h^2 \varphi(x_1)/2 \\ h^2 \varphi(x_1) \\ h^2 \varphi(x_2) \\ \vdots \\ h^2 \varphi(x_{n-2}) \\ h^2 \varphi(x_{n-1}) - u_b \end{array} \right.$$

Además:  $\hat{u}_n = u_b$

## 2.2) Con extensiones del dominio (con "puntos fantasma")



$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{u(x_{i-1}) - 2u(x_i) + u(x_{i+1}))}{h^2} - \varphi(x_i) + \mathcal{O}(h^2) = 0 \\ \frac{\hat{u}_{i-1} - 2\hat{u}_i + \hat{u}_{i+1}}{h^2} - \varphi(x_i) = 0 \end{array} \right. \quad \text{¡¡¡ooo!}$$

para  $i = 0, \dots, n-1$

c.c.

$$[u_x - u'_a]_{x=x_0} = 0$$

$\rightarrow u_x|_{x=x_0} = \frac{u(x_1) - u(x_{-1}))}{2h} + \mathcal{O}(h^2)$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{u(x_1) - u(x_{-1}))}{2h} - u'_a + \mathcal{O}(h^2) = 0 \\ \frac{\hat{u}_1 - \hat{u}_{-1}}{2h} - u'_a = 0 \end{array} \right.$$

$u(x_n) = u_b \rightarrow \hat{u}_n = u_b$


$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & & & & & & \\ 1 & -2 & 1 & & & & & & \\ & 1 & -2 & 1 & & & & & \\ & & 1 & -2 & 1 & & & & \\ & & & 1 & -2 & 1 & & & \\ & & & & 1 & -2 & 1 & & \\ & & & & & 1 & -2 & 1 & \\ & & & & & & 0 & 1 & \\ & & & & & & & & 1 & \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{u}_{-1} \\ \hat{u}_0 \\ \hat{u}_1 \\ \hat{u}_2 \\ \vdots \\ \hat{u}_{n-2} \\ \hat{u}_{n-1} \\ \hat{u}_n \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2h u'_a \\ h^2 \varphi(x_0) \\ h^2 \varphi(x_1) \\ h^2 \varphi(x_2) \\ \vdots \\ h^2 \varphi(x_{n-2}) \\ h^2 \varphi(x_{n-1}) \\ u_b \end{Bmatrix} \quad \text{¡¡¡ooo!}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & & & & & & & \\ 1 & -2 & 1 & & & & & & \\ & 1 & -2 & 1 & & & & & \\ & & 1 & -2 & 1 & & & & \\ & & & 1 & -2 & 1 & & & \\ & & & & 1 & -2 & 1 & & \\ & & & & & 1 & -2 & 1 & \\ & & & & & & & & & \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{u}_0 \\ \hat{u}_1 \\ \hat{u}_2 \\ \vdots \\ \hat{u}_{n-2} \\ \hat{u}_{n-1} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} h u'_a + h^2 \varphi(x_0)/2 \\ h^2 \varphi(x_1) \\ h^2 \varphi(x_2) \\ \vdots \\ h^2 \varphi(x_{n-2}) \\ h^2 \varphi(x_{n-1}) - u_b \end{Bmatrix}$$

Además  $\hat{u}_n = u_b$


# PROBLEMAS ELÍPTICOS 2D

$$\xi: \begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = f(x,y) & (x,y) \in \Omega \\ u(x,y) = g(x,y) & (x,y) \in \Gamma \end{cases}$$



Discretización:

$$\hat{u}_{ij} \approx u(x_i, y_j)$$



Nota:

- En este caso  $\Delta x = \Delta y = h$  (no tiene por qué ser así)

- Incógnitas  $\begin{cases} \hat{u}_{12}, \hat{u}_{22}, \hat{u}_{32} \\ \hat{u}_{11}, \hat{u}_{21}, \hat{u}_{31} \end{cases}$

$$\left[ (u_{xx} + u_{yy}) - \varphi(x_i, y_j) \right] \Big|_{\substack{x=x_i \\ y=y_j}} = 0 \quad ; \quad \begin{matrix} i=1, \dots, 3 \\ j=1, 2 \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (u_{xx} + u_{yy}) \Big|_{\substack{x=x_i \\ y=y_j}} &= \frac{u(x_{i-1}, y_j) - 2u(x_i, y_j) + u(x_{i+1}, y_j)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2) \\ &+ \frac{u(x_i, y_{j-1}) - 2u(x_i, y_j) + u(x_i, y_{j+1}))}{h^2} + \mathcal{O}(h^2) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{u(x_{i-1}, y_j) + u(x_i, y_{j-1}) - 4u(x_i, y_j) + u(x_i, y_{j+1}) + u(x_{i+1}, y_j) - \varphi(x_i, y_j)}{h^2} = 0$$

$$\hat{u}_{i-1,j} + \hat{u}_{i,j-1} - 4\hat{u}_{i,j} + \hat{u}_{i,j+1} + \hat{u}_{i+1,j} - \varphi(x_i, y_j) = 0$$

para  $\begin{cases} i=1, \dots, 3 \\ j=1, 2 \end{cases}$

c.c:  $u(x_i, y_j) = g(x_i, y_j) \rightarrow \hat{u}_{i,j} = g(x_i, y_j)$  en el contorno  $\Gamma$

$$\Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|ccc} -4 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -4 \end{array} \right] \begin{pmatrix} \hat{u}_{1,2} \\ \hat{u}_{2,2} \\ \hat{u}_{3,2} \\ \hat{u}_{1,1} \\ \hat{u}_{2,1} \\ \hat{u}_{3,1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h^2 \varphi_{1,2} - g_{0,2} - g_{1,3} \\ h^2 \varphi_{2,2} - g_{2,3} \\ h^2 \varphi_{3,2} - g_{4,2} - g_{3,3} \\ h^2 \varphi_{1,1} - g_{0,1} - g_{1,0} \\ h^2 \varphi_{2,1} - g_{2,0} \\ h^2 \varphi_{3,1} - g_{4,1} - g_{3,0} \end{pmatrix}$$

Matriz  $\begin{cases} - \text{Simétrica} \\ - \text{Diagonalmente dominante} \end{cases}$