

- 1.– En el conjunto de las matrices  $n \times n$  de elementos reales, demostrar que el producto de matrices triangulares inferiores es otra matriz triangular inferior.

**(Primer parcial, febrero 2000)**

---

- 2.– Sea  $A$  una matriz diagonal  $n \times n$  y supongamos que todos los elementos de su diagonal son distintos entre sí. Demostrar que cualquier matriz  $n \times n$  que conmute con  $A$  ha de ser diagonal.

**(Examen final, junio 2002)**

---

- 3.– Sabiendo que  $A, B, C$  son matrices inversibles  $n \times n$  calcular  $\text{traza}(M)$ , siendo:

$$M = (A \cdot B \cdot C)^{-1} - (B^t \cdot C)^{-1} + C^{-1} \cdot [(B^{-1} + C^t)^t - (A \cdot B)^{-1}]$$

**(Examen final, junio 2023)**

---

- 4.– Sean  $A, B \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ . Razonar la falsedad o veracidad de las siguientes afirmaciones:

- (i)  $AB = 0 \Rightarrow A = 0$  ó  $B = 0$ .
- (ii)  $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ .
- (iii) Si  $C$  es inversible y  $AB = C$  entonces  $A, B$  son inversibles.

**(Examen final, enero 2016)**

---

- 5.– Sea  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  una matriz cuadrada cumpliendo  $A^2 + A + Id = 0$ .

- (i) Demostrar que  $A$  es inversible.
- (ii) Probar que  $A^{-1} = -(A + Id) = A^2$ .
- (iii) ¿Cuánto vale  $A^3$ ? ¿Y  $A^{2013}$ ?

**(Examen octubre, 2013)**

---

- 6.– Calcular la potencia  $n$ -ésima de la matriz:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
-

7.— Dada la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} x & x+1 & x+2 \\ x+3 & x+2 & x+1 \\ x+2 & x & x+4 \end{pmatrix}$$

- (i) Hallar  $x$  para que  $\det(A) = 0$ .
- (ii) Estudiar el rango de  $A$  en función de los valores de  $x$ .

**(Examen final, julio 2015)**

---

8.— Sea  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  cumpliendo  $A^4 = A$ . Analizar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

- (i)  $A^3 = Id$ .
- (ii)  $A^{34} = A$ .
- (iii) Si  $A$  es inversible, entonces  $\det(A) = 1$ .
- (iv) Puede ocurrir que  $A^2 = A$ .

**(Examen, octubre 2017)**

---

9.— Sean  $A, B \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$  dos matrices. Razonar la falsedad o veracidad de las siguientes cuestiones:

- (i) Si  $\text{rango}(A) = n$  entonces  $m \geq n$ .
- (ii) Si  $\text{rango}(A) = 1$  entonces  $A$  tiene todas las filas nulas menos una.
- (iii) Si  $n = m$  entonces  $\text{rango}(A^2) = \text{rango}(A)$ .
- (iv) Si  $B$  es inversible,  $\text{rango}(AB^t) = \text{rango}(A)$ .

**(Examen final, julio 2021)**

---

10.— Sean  $A, B, C \in M_{6 \times 6}(\mathbb{R})$  matrices verificando  $-ABA^t = CA + A$ ,  $\det(B) = 1$ ,  $A$  inversible. Sabiendo que  $C$  es una matriz diagonal con  $c_{ii} = i$ , calcular  $\det(A)$ .

**(Examen final, enero 2016)**

---

11.— Calcular razonadamente los siguientes determinantes:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 5 & 7 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 12 & 123 & 1234 \\ 2 & 23 & 234 & 2341 \\ 3 & 34 & 341 & 3412 \\ 4 & 41 & 412 & 4123 \end{vmatrix}.$$

---

12.– Sabiendo que  $\det \begin{pmatrix} 2 & b & 3 \\ a & 0 & 1 \\ 1 & 5 & c \end{pmatrix} = 5$  calcular:

$$(i) \det \begin{pmatrix} 2-3a & b & 0 \\ 2 & b & 3 \\ 5 & 2b+5 & c+6 \end{pmatrix} \quad (ii) \det \begin{pmatrix} b & 5 & 0 \\ 4 & c+2 & 2 \\ a+2 & 2a+1 & 2a \end{pmatrix}.$$

(Examen final, julio 2020)

---

13.– Dados  $a, b \in \mathbb{R}$  se define la matriz  $4 \times 4$ :

$$A = \begin{pmatrix} b & b & b & a \\ b & b & a & b \\ b & a & b & b \\ a & b & b & b \end{pmatrix}$$

- (i) Calcular  $\det(A)$  y  $\text{traza}(A)$  en función de  $a$  y  $b$ .
- (ii) Estudiar el rango de  $A$  en función de los valores de  $a$  y  $b$ .
- (iii) Hallar  $a$  y  $b$  para que  $\det(AA^t) = 0$ .

(Examen final, julio 2025)

---

14.– Dado  $n \in \mathbb{N}$  se define la matriz  $P_n \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$  como:

$$(P_n)_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } i = j + 1 \\ i & \text{si } i \neq j + 1 \end{cases}$$

- (i) Escribir la matriz  $P_4$ .
- (ii) Hallar el determinante de  $P_4$ .
- (iii) En general hallar  $\det(P_n)$ .

(Examen final, enero 2019)

---

15.– Dado  $n \in \mathbb{N}$  y  $k \in \mathbb{R}$  se define la matriz  $P_n \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$  como:

$$(P_n)_{ij} = \begin{cases} k & \text{si } i = j \\ 1 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

- (i) Escribir la matriz  $P_4$  y hallar  $\det(P_4)$  y  $\text{rango}(P_4)$  en función de  $k$ .
- (ii) Para cualquier  $n \geq 2$ , hallar  $\det(P_n)$  y  $\text{rango}(P_n)$  en función de  $n$  y  $k$ .

(Examen final, enero 2024)

---

**16.**— Dado  $n \in \mathbb{N}$  se define la matriz  $P_n \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$  como:

$$(P_n)_{ij} = \begin{cases} i & \text{si } j \leq n + 1 - i \\ 0 & \text{si } j > n + 1 - i \end{cases}$$

- (i) Escribir la matriz  $P_5$  y hallar su determinante.
- (ii) Para cualquier  $n \geq 2$ , hallar  $\det(P_n)$  y  $\text{traza}(P_n)$ .

**(Examen final, enero 2021)**

---

**17.**— Dado  $n \in \mathbb{N}$  se define la matriz  $P_n \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$  como:

$$(P_n)_{ij} = \begin{cases} 2 & \text{si } i > j \\ 1 & \text{si } i \leq j \end{cases}$$

- (i) Escribir la matriz  $P_4$ .
- (ii) Hallar el determinante de  $P_4$ .
- (iii) Para cualquier  $n \geq 2$ , hallar  $\det(P_n)$ ,  $\text{traza}(P_n)$ ,  $\det(P_n^{2020})$ .

**(Examen enero, 2020)**

---

**I.**– En el conjunto de las matrices  $n \times n$  de elementos reales, demostrar que si  $AA^T = \Omega$ , entonces  $A = \Omega$ .

**(Primer parcial, febrero 2000)**

---

**II.**– Calcular las potencias  $n$ -ésimas de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \\ c & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix}.$$

---

**III.**– Para las siguientes familias de matrices no singulares de  $\mathcal{M}_{n \times n}(K)$ , decidir si verifican alguna de las dos condiciones: (a) dada una matriz de la familia, su inversa también pertenece a la familia; (b) dadas dos matrices de la familia, su producto también pertenece a la familia.

- (1) las matrices simétricas regulares,
  - (2) las matrices regulares que conmutan con una matriz dada  $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(K)$ ,
  - (3) las matrices ortogonales.
- 

**IV.**– Sea  $A$  una matriz columna de orden  $n \times 1$  tal que  $A^t A = 1$  y  $B = Id_n - 2AA^t$ . Demostrar que:

- a)  $B$  es simétrica
  - b)  $B^{-1} = B^t$
- 

**V.**– Para cada  $n \in \mathbb{N}$  se define la matriz  $A_n \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$  como:

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n-1 & n-1 & n-1 & \dots & 1 & 1 \\ n & n & n & \dots & n & 1 \end{pmatrix}$$

- (i) Dar una expresión para el elemento  $a_{ij}$  en función de  $i, j$ .
- (ii) Calcular  $\det(A_4)$ .
- (iii) Para  $n \geq 2$ , calcular traza  $A_n$ ,  $\det(A_n)$  e  $\text{rango}(A_n)$ .

**(Examen final, julio 2024)**

---

**VI.**— Sea  $X$  una matriz cuadrada de tamaño  $n \times n$  y elementos reales. Sea  $k$  un número par. Probar que si  $X^k = -Id$ , entonces  $n$  es también un número par.

---

**VII.**— Dada la matriz  $m \times n$  con  $m, n > 1$ ,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n-1 & n \\ n+1 & n+2 & \dots & 2n-1 & 2n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ (m-1)n+1 & (m-1)n+2 & \dots & mn-1 & mn \end{pmatrix}$$

expresar  $a_{ij}$  en función de  $i$  y  $j$ , y calcular su rango.

**(Examen final, septiembre 2005)**

---

**VIII.**— Si  $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ u & v & w \end{pmatrix}$  y  $\det(A) = 3$ , calcular  $\det(2C^{-1})$  donde  $C = \begin{pmatrix} 2p & -a+u & 3u \\ 2q & -b+v & 3v \\ 2r & -c+w & 3w \end{pmatrix}$ .

**(Examen final, enero 2014)**

---

**IX.**— Calcular el siguiente determinante:

$$\begin{vmatrix} 0 & x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ x_2 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix}$$

¿ Para qué valores reales de  $x_1, x_2, \dots, x_n$  se anula?.

**(Examen final, 2011)**

---

**X.**— Dados  $n \in \mathbb{N}$  y  $a, b \in \mathbb{R}$  se considera la matriz  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ :

$$A = \begin{pmatrix} a+b & a & a & \dots & a & a \\ a & a+b & a & \dots & a & a \\ a & a & a+b & \dots & a & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a & a & a & \dots & a+b & a \\ a & a & a & \dots & a & a+b \end{pmatrix}$$

(i) Hallar  $\det(A)$  en función de  $a, b, n$ .

(ii) Hallar  $\text{rango}(A)$  en función de  $a, b, n$ .

**(Examen parcial, octubre 2014)**

---

**XI.**— Hallar el siguiente determinante para  $n \geq 2$

$$A_n = \begin{vmatrix} x_1 + y_1 & x_1 + y_2 & x_1 + y_3 & \cdots & x_1 + y_n \\ x_2 + y_1 & x_2 + y_2 & x_2 + y_3 & \cdots & x_2 + y_n \\ x_3 + y_1 & x_3 + y_2 & x_3 + y_3 & \cdots & x_3 + y_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n + y_1 & x_n + y_2 & x_n + y_3 & \cdots & x_n + y_n \end{vmatrix}$$

**(Primer parcial, febrero 2003)**

---

**XII.**— Sea  $A = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & d & -c \\ -c & -d & a & b \\ -d & c & -b & a \end{pmatrix}$

- (i) Hallar  $AA^t$ .
- (ii) Calcular  $\det(AA^t)$  y  $\det(A)$ .
- (iii) Determinar el rango de  $A$  en función de los valores de  $a, b, c, d$ .

**(Examen final, julio 2019)**

---

**XIII.**— Dado  $n \in \mathbb{N}$  se define la matriz  $P_n \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$  como:

$$(P_n)_{ij} = \begin{cases} i & \text{si } i \leq j \\ 1 & \text{si } i > j \end{cases}$$

- (i) Escribir la matriz  $P_4$  y hallar su determinante.
- (ii) Para cualquier  $n \geq 2$ , hallar  $\det(P_n)$ ,  $\text{traza}(P_n)$  y  $\det(P_n^{-1})$ .

**(Examen enero, 2022)**

---

**XIV.**— Sea  $n > 2$  y  $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ , una matriz inversible. Sea  $\text{adj}(A)$  su matriz adjunta. Probar que:

- (a)  $\det(\text{adj}(A)) = \det(A)^{n-1}$ .
- (b)  $\text{adj}(\text{adj}(A)) = \det(A)^{n-2} \cdot A$ .

**(Primer parcial, enero 2010)**

---

**XV.**— Sean  $A, B \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ . Razonar la falsedad o veracidad de las siguientes afirmaciones:

- (i) Si  $\text{rango}(A) = 1$  entonces  $\text{rango}(AB) \leq 1$ .
- (ii) Si  $\text{rango}(A) = \text{rango}(B)$  entonces  $\text{rango}(AB) = \text{rango}(A)$ .
- (iii)  $\text{rango}(A) + \text{rango}(B) = \text{rango}(A + B)$ .
- (iv)  $\text{rango}(A) + \text{rango}(B) > \text{rango}(A + B)$ .

**(Examen final, enero 2017)**

---