

- 1.— Se considera un espacio euclídeo de dimensión 3, y en él una base $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ tal que el módulo de \bar{e}_1 y el de \bar{e}_3 es 2 y el de \bar{e}_2 es 1, y además el ángulo formado por \bar{e}_1 y \bar{e}_3 es de 90° y los formados por \bar{e}_1 y \bar{e}_2 y por \bar{e}_2 y \bar{e}_3 son de 60° . Se dan los vectores

$$\begin{aligned}\bar{a} &= \bar{e}_1 - \bar{e}_2 \\ \bar{b} &= \bar{e}_1 - 2\bar{e}_2 + \bar{e}_3\end{aligned}$$

Se pide:

- Matriz de Gram en la base $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$
- Módulo de \bar{a} y de \bar{b} .
- Producto escalar de \bar{a} por \bar{b} .
- Calcular un vector de módulo 2, que forme un ángulo de 90° con \bar{a} y uno de 60° con \bar{b} .

-
- 2.— En \mathbb{R}^3 se considera una forma bilineal f cuya matriz asociada respecto a la base canónica es:

$$F_C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 6 \\ 2 & 6 & 13 \end{pmatrix}$$

- Probar que F_C define un producto escalar.
- Con respecto al producto escalar definido por f :
 - Calcular una base ortonormal de \mathbb{R}^3 .
 - Calcular la norma del vector $(-1, 1, 0)$.

(Examen final, mayo 2017)

- 3.— En el espacio vectorial \mathbb{R}^3 se considera un producto escalar cuya matriz de Gram respecto de la base canónica es:

$$G_C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcular la matriz asociada respecto de la base canónica de la aplicación proyección ortogonal sobre el subespacio vectorial:

$$V = \mathcal{L}\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$$

(Examen final, junio 2019)

- 4.— En el espacio vectorial \mathbb{R}^3 se considera la base $B = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$ y un producto escalar cuya matriz de Gram respecto de la base B es:

$$G_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Dados los vectores $\vec{v} = (1, 0, 1)$, $\vec{u} = (0, 1, 1)$ calcular $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ y el ángulo que forman.

(Examen final, julio 2019)

- 5.— En \mathbb{R}^3 se considera un producto escalar $f : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ cumpliendo:

- Los subespacios vectoriales $\mathcal{L}\{(1, 0, 1)\}$ y $\mathcal{L}\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ son ortogonales.
- Los vectores $(1, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ forman un ángulo de $\pi/3$.
- Los tres vectores anteriores son unitarios.

- (i) Calcular la matriz de Gram del producto escalar respecto de la base canónica.
- (ii) Dado $U = \mathcal{L}\{(1, 1, 1), (1, 1, 2), (2, 2, 3)\}$ calcular una base de su subespacio ortogonal U^\perp respecto al producto escalar dado.

(Examen final, mayo 2018)

- 6.— En el espacio vectorial $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ se considera la aplicación:

$$f : \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(A, B) = \text{traza}(AB^t)$$

- (i) Demostrar que f es un producto escalar.
- (ii) Calcular la matriz de Gram de f respecto de la base canónica.
- (iii) Si $U = \mathcal{L}(Id)$, hallar una base del subespacio ortogonal U^\perp .

(Examen final, julio 2018)

- 7.— Dada la forma bilineal:

$$f : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f((x, y, z), (x', y', z')) = xx' + xy' + x'y + 2yy' + 2yz' + 2y'z + xz' + x'z + 4zz'$$

- (a) Probar que f define un producto escalar.
- (b) Con el producto escalar definida por f :
 - (i) Hallar una base ortonormal de \mathbb{R}^3 .
 - (ii) Hallar la proyección ortogonal del vector $(1, 0, 1)$ sobre el subespacio $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + z = 0\}$.

(Examen final, junio 2014)

8.— Se considera el espacio vectorial real E de las funciones continuas $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ y la aplicación

$$\begin{aligned} p : E \times E &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) &\longrightarrow \int_0^\pi f(x) g(x) dx. \end{aligned}$$

- (a) Demostrar que esta aplicación dota a E de la estructura de espacio vectorial euclídeo.
(b) Si llamamos U al subespacio vectorial generado por $\{1, \operatorname{sen}x, \operatorname{cos}x, \operatorname{sen}^2x\}$, encontrar una base ortogonal de U usando el método de ortogonalización de Gram-Schmidt.

9.— Se considera el espacio vectorial real \mathbb{R}^3 dotado del producto escalar ordinario. Encontrar la matriz F , en la base canónica, de un endomorfismo simétrico f de \mathbb{R}^3 , sabiendo que el núcleo de f es el subespacio $\mathcal{L}\{(1, 1, 1)\}$ y 3 es autovalor doble de f .

(Examen final, setiembre 2002)

10.— Sea el espacio vectorial euclideo \mathbb{R}^3 ; se considera una forma bilineal $f : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ cuya matriz asociada en la base canónica es:

$$F_C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$$

- (i) ¿Para qué valores de a es f un producto escalar?
(ii) Calcular a para que los vectores $(1, 0, 1)$ y $(0, 3, -1)$ sean ortogonales respecto al producto escalar definido por f .
(iii) Para $a = 4$ y con respecto al producto escalar que define f dar una base ortonormal y calcular el ángulo que forman los vectores $(1, 0, 0)$ y $(0, 1, 0)$.

(Examen final, mayo 2015)

11.— En el espacio vectorial \mathbb{R}^3 se considera el producto escalar dado por la matriz de Gram:

$$G_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Calcular, respecto de la base canónica, la matriz asociada a la aplicación proyección ortogonal sobre el subespacio:

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0, \quad y + 2z = 0\}.$$

¿Cuál es la proyección ortogonal de $(1, 1, 1)$ sobre el subespacio U ?

(Examen final, julio 2015)

12.— Hallar la matriz de Gram respecto de la base canónica de un producto escalar, sabiendo que:

- Los vectores $(1, 0)$ y $(0, 1)$ forma un ángulo de 60 grados.
- $\|(1, 1)\| = \sqrt{3}$.
- $B = \{(1, 0), (1, -2)\}$ es una base ortogonal.

(Examen final, julio 2017)

I.— En un espacio vectorial real V de dimensión 3 se considera una cierta base $B = \{\bar{e}_i\}$. Hallar, en esa base, la matriz métrica G de un producto escalar definido en V del que se sabe que:

- (a) El módulo de \bar{e}_1 es $\sqrt{2}$ y el de \bar{e}_2 es $\sqrt{3}$.
- (b) El subespacio vectorial U , definido por la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ en la base B , es ortogonal a la envolvente de \bar{e}_1 .
- (c) La proyección ortogonal de $\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3$ sobre la envolvente de \bar{e}_2 es $3\bar{e}_2$.
- (d) El vector \bar{e}_3 es ortogonal a alguno del conjunto $C = \{(2, 2, 0), (2, 0, -1), (0, 2, -1)\}$, cuyos elementos vienen dados por sus coordenadas en la base B .

(Examen final, junio 1998)

II.— En un espacio vectorial V de dimensión n , se considera una forma bilineal f cuya matriz en una determinada base $\{\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n\}$ es A^2 , siendo A una matriz real $n \times n$, no singular y simétrica. Demostrar que f es un producto escalar. Encontrar, en función de $\{\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n\}$, una base ortonormal para f .

III.— Sea un espacio vectorial euclídeo V de dimensión finita, y dos subespacios cualesquiera suyos U_1 y U_2 . Comprobar que:

- (a) $(U_1 + U_2)^\perp = U_1^\perp \cap U_2^\perp$
 - (b) $(U_1 \cap U_2)^\perp = U_1^\perp + U_2^\perp$
-

IV.— En \mathbb{R}^3 y con respecto a una determinada base $\{\bar{e}_i\}$ se definen el producto escalar

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = 2x_1y_1 + 2x_2y_2 + 3x_3y_3 + x_1y_2 + x_2y_1 + 2x_1y_3 + 2x_3y_1$$

y el endomorfismo f que verifica: $f(\bar{e}_1) = 2\bar{e}_1$, $f(\bar{e}_2) = 3\bar{e}_1 - 2\bar{e}_3$, $f(\bar{e}_3) = 2\bar{e}_3$. ¿Es f un endomorfismo simétrico con respecto al producto escalar dado arriba? En caso afirmativo, dar una base ortonormal en la que la matriz de f sea diagonal.

V.— En un espacio euclídeo V se tienen dos subespacios suplementarios V_1 y V_2 . Demostrar que la condición necesaria y suficiente para que la proyección sobre V_1 paralelamente a V_2 sea simétrica es que V_1 y V_2 sean ortogonales.

(Examen extraordinario, septiembre 2004)

VI.— Dada la matriz $n \times n$ A definida por

$$a_{ij} = 1 \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\},$$

¿es diagonalizable por semejanza ortogonal? En caso de que lo sea, dar una matriz de paso.

(Examen extraordinario, septiembre 1999)

VII.— En un espacio euclídeo se consideran los vectores fijos y no nulos \bar{a} y \bar{b} y la aplicación $f(\bar{x}) = (\bar{a} \cdot \bar{x})\bar{b} - 3\bar{x}$. Se pide:

- (a) Ver si f es lineal.
- (b) Determinar los autovalores y autovectores.
- (c) ¿Qué condición han de cumplir \bar{a} y \bar{b} para que f sea diagonalizable?

(Examen final, junio 1997)

VIII.— Sea $f : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow R$ una forma bilineal cuya matriz en la base canónica es

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

y sea $S \subset \mathbb{R}^3$ el subespacio generado por $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, -1, 0)\}$.

- (a) Probar que la forma bilineal f define un producto escalar.
- (b) Obtener una base ortogonal de S respecto del producto escalar f .

(Examen final, septiembre 2005)

IX.— Analizar razonadamente la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación: “El conjunto formado por dos vectores no nulos y ortogonales entre sí es un sistema libre”.

(Examen extraordinario, diciembre 2006)

X.— Consideramos los productos escalares en \mathbb{R}^2 cuyas matrices de Gram respecto de la base canónica son G_1 y G_2 . Sabiendo que $G_1 = \lambda G_2$ con $\lambda \in R$, $\lambda > 1$, probar que los dos productos escalares definen la misma medida sobre ángulos de vectores, pero distinta en longitudes.

(Examen final, septiembre 2008)

XI.— En el espacio de matrices $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ consideramos las formas bilineales:

$$\begin{aligned} f : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \times M_{n \times n}(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R}, & f(A, B) &= \text{traza}(AB^t) \\ g : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \times M_{n \times n}(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R}, & g(A, B) &= \text{traza}(AB) \end{aligned}$$

- (a) Estudiar si son simétricas.
- (b) Probar que para $n \geq 2$, f define un producto escalar, pero g no. ¿Qué ocurre para $n = 1$?
- (c) Para $n = 2$ calcular la matriz asociada a g respecto de la base canónica, hallar la signatura y clasificar la forma cuadrática asociada.
- (d) Para $n = 2$ y con el producto escalar definido por f , calcular la matriz asociada respecto de la base canónica de la aplicación proyección ortogonal sobre el subespacio de matrices simétricas.
- (e) Para $n = 2$ y con el producto escalar definido por f , hallar una base ortonormal del subespacio generado por las matrices:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

- (f) Para cualquier $n > 2$, hallar la signatura y clasificar la forma cuadrática asociada a g .

(Segundo parcial, junio 2009)
