

1.— Se considera el espacio vectorial euclídeo  $\mathbb{R}^3$  referido a una base ortonormal. Obtener la expresión matricial en esta base de:

- (a) la simetría ortogonal con respecto al subespacio  $\mathcal{L}\{(1, 1, 1)\}$ ;
- (b) la simetría ortogonal con respecto al subespacio  $\mathcal{L}\{(1, 1, 1), (2, 0, 1)\}$ ;
- (c) la rotación de  $60^\circ$  alrededor del semieje que contiene al  $(1, 1, 1)$  (considerando en  $\mathbb{R}^3$  la orientación correspondiente a la base de partida).

---

2.— En  $\mathbb{R}^3$  se considera el producto escalar usual y la orientación dada por la base canónica. Calcular las ecuaciones del giro de 45 grados y semieje generado por el vector  $(1, 1, 1)$ .

**(Examen extraordinario, septiembre 2007)**

---

3.— En  $\mathbb{R}^3$  se considera el producto escalar cuya matriz de Gram respecto a la base canónica es:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Hallar la matriz asociada respecto de la base canónica de un giro de  $36.87^\circ$ , de semieje generado por el vector  $(1, 0, 0)$  y considerando como orientación positiva la dada por la base canónica.

**Observación:**  $\sin(36.87^\circ) = \frac{3}{5}$ .

**(Examen extraordinario, diciembre 2008)**

---

4.— En  $\mathbb{R}^3$  consideramos el producto escalar usual y la orientación de la base canónica. Se define la transformación ortogonal que en esta base tiene asociada la matriz

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 1 \\ -\sqrt{2} & 0 & \sqrt{2} \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}$$

Definir su naturaleza y descomponerla en giros y/o simetrías.

**(Examen final, julio 2015)**

---

5.— Sea  $\mathbb{R}^3$  el espacio euclideo con el producto escalar usual y la orientación positiva dada por la base canónica. Se considera el endomorfismo:

$$t : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad t(x, y, z) = \left( \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y + \frac{\sqrt{2}}{2}z, \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y - \frac{\sqrt{2}}{2}z, \frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{\sqrt{2}}{2}y \right).$$

- (i) Probar que  $t$  es una transformación ortogonal.
- (ii) Describir geoméricamente la transformación  $t$ .
- (iii) Dada la recta  $r$  de ecuaciones  $x + y = 0$ ,  $z = 0$ , hallar las ecuaciones de la recta que se obtiene al aplicarle el endomorfismo  $t$  a  $r$ .

**(Examen final, mayo 2014)**

---

6.— Razonar la falsedad o veracidad de las siguientes afirmaciones:

- (i) Conocida la traza de la matriz asociada a una transformación ortogonal en el plano se puede determinarse si es un giro o una simetría.
- (ii) En el espacio, la composición de un giro con una simetría respecto a un plano puede ser una simetría respecto a una recta.
- (iii) En el espacio, la composición de un giro con una simetría respecto a una recta siempre es un giro.
- (iv) Si la traza de la matriz asociada a una transformación ortogonal en el espacio es 3, entonces es una simetría respecto al origen.

**(Examen final, julio 2016)**

---

7.— En  $\mathbb{R}^2$  con el producto escalar usual y la orientación positiva dada por la base canónica se tiene un endomorfismo de matriz asociada en la base canónica:

$$T = \begin{pmatrix} a & 3/5 \\ c & b \end{pmatrix}$$

- (i) Hallar los valores de  $a, b, c$  para los cuales  $T$  es una transformación ortogonal.
- (ii) Para cada uno de los casos anteriores clasificar la correspondiente transformación ortogonal indicando si procede el ángulo de giro ó el eje de simetría.

**(Examen final, mayo 2015)**

---

8.— Consideramos el espacio vectorial euclideo  $\mathbb{R}^3$  con el producto escalar usual. Calcular la matriz asociada  $T_C$  (respecto de la base canónica) de una transformación ortogonal  $t : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$  que cumple:

$$\det(T_C) = -1, \quad \text{traza}(T_C) = 1/5, \quad t(0, 1, 0) = (0, -1, 0).$$

¿Es única la solución?

**(Examen final, mayo 2011)**

---

9.— En el espacio euclideo  $\mathbb{R}^3$  con el producto escalar usual consideramos los planos  $\pi_1 : x + y - z = 0$  y  $\pi_2 : 2x - y + z = 0$ . Hallar las ecuaciones de un giro que lleve el plano  $\pi_1$  en el plano  $\pi_2$ .

---

**10.**— En el espacio euclídeo  $\mathbb{R}^3$  y con respecto a una base ortonormal, se consideran los subespacios  $U$  generado por los vectores  $\bar{u}_1 = (1, 2, -2)$  y  $\bar{u}_2 = (1, 1, 0)$  y  $V$  generado por el vector  $\bar{v} = (1, 0, -1)$ . Hallar el subespacio vectorial simétrico del  $V$  respecto de  $U$ .

---

**11.**— Sea el espacio euclideo  $\mathbb{R}^3$  con el producto escalar usual y consideremos como orientación positiva la dada por la base canónica. Para cada  $a, b \in \mathbb{R}$ , se considera un endomorfismo  $t : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  cuya matriz asociada respecto de la base canónica es:

$$T = \begin{pmatrix} a & a & b \\ a & a & -b \\ -b & b & 0 \end{pmatrix}$$

- (i) Hallar los valores de  $a$  y  $b$  para las cuales  $t$  es una transformación ortogonal.
- (ii) Para los valores hallados en (i) clasificar la transformación ortogonal, indicando si procede el semieje de giro, ángulo de giro y/o subespacios de simetría.

**(Examen final, junio 2010)**

---

**12.**— En el espacio euclideo  $\mathbb{R}^3$  con el producto escalar usual y la orientación positiva dada por la base canónica, para cada par de números reales  $a, b \in \mathbb{R}$  se considera el endomorfismo:

$$t : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad t(x, y, z) = (ax + bz, -y, bx + az)$$

- (i) Hallar los valores de  $a, b$  para que  $t$  sea una transformación ortogonal.
- (ii) Para cada uno de los casos determinados en el apartado anterior, clasificar la transformación describiéndola geoméricamente.

**(Examen final, julio 2014)**

---

**13.**— Responde de manera argumentada a las siguientes cuestiones:

- (i) ¿Cuál es el valor máximo de la traza de una matriz asociada a una transformación ortogonal en  $\mathbb{R}^3$ ?
- (ii) ¿Cuál es el valor máximo de la traza de una matriz asociada a una transformación ortogonal inversa en  $\mathbb{R}^3$ ?
- (iii) Si la matriz asociada a un giro en  $\mathbb{R}^3$  tiene traza cero. ¿Cuáles son los posibles valores del ángulo de giro?
- (iv) Si  $f$  es una simetría del plano con el producto escalar usual y  $f(1, 2) = (-1, -2)$ . ¿Cuál es el eje de simetría?

**(Examen mayo, julio 2015)**

---

**14.**— En  $\mathbb{R}^3$  dotado del producto escalar usual y tomando como orientación positiva la dada por la base canónica se consideran las transformaciones ortogonales  $f, g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ . Se sabe que  $f$  es un giro de 90 grados y  $g$  un giro de 30 grados. Sean  $A, B$  las matrices asociadas respectivamente a  $f$  y  $g$  con respecto a la base canónica. Razonar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

- (i)  $A \cdot B$  es la matriz de una transformación ortogonal.
- (ii)  $A \cdot B$  es la matriz de un giro.
- (iii)  $A \cdot B$  es la matriz de un giro de 120 grados.
- (iv) Si  $f$  y  $g$  tiene el mismo eje de giro,  $A \cdot B$  es la matriz de un giro de 120 grados.
- (v)  $A \cdot B$  puede ser la matriz de un giro de 60 grados.

**(Examen final, mayo 2013)**

---

**I.**— Sea  $V$  un espacio vectorial euclídeo. Sea  $B = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\}$  una base de  $V$  que define la orientación positiva. La matriz de Gram del producto escalar en la base  $B$  es:

$$G_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcular respecto a la base dada la matriz de giro de ángulo  $\pi/3$  respecto al semieje generado por el vector  $(1, 0, 0)$

**(Segundo parcial, junio 2006)**

---

**II.**— En  $\mathbb{R}^3$  con respecto al producto escalar usual y considerando como orientación positiva la dada por la base canónica escoger un semieje de giro y un ángulo de giro que lleve los semiejes positivos  $OX, OY, OZ$  en, respectivamente, los semiejes positivos  $OY, OZ, OX$ .

**(Segundo parcial, junio 2009)**

---

**III.**— Sea  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  una transformación ortogonal con respecto al producto escalar usual. Clasificarla indicando, si procede, el ángulo de giro y/o subespacio de simetría, sabiendo que:

$$f(1, 0, 0) = (-1, 0, 0), \quad \det(F_{CC}) = -1, \quad \text{traza}(F_{CC}) = 1.$$

**(Examen final, junio 2008)**

---

**IV.**— Consideramos el espacio euclídeo  $\mathbb{R}^3$  con el producto escalar usual. Sea  $t : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  una transformación ortogonal y  $T$  la matriz asociada a  $t$  respecto una base  $B$  arbitraria. Razonar la falsedad o veracidad de las siguientes cuestiones:

- (i) Si  $B$  es una base ortonormal entonces  $T$  es simétrica.
- (ii) Si  $B$  es una base ortonormal entonces  $T^{-1} = T^t$ .
- (iii) Si  $T$  es una simetría respecto a una recta entonces  $\text{traza}(T) = -1$ .
- (iv) Si  $\text{traza}(T) = -1$  entonces  $T$  es una simetría respecto a una recta.
- (v) Si  $T^{2012}$  es un giro entonces  $T$  es un giro.

**(Examen final, julio 2012)**

---

**V.**— En  $\mathbb{R}^2$  con el producto escalar usual, hallar cuando sea posible, las ecuaciones de una transformación ortogonal directa que lleve el vector  $(3, 4)$  en el vector:

- a)  $(2, 6)$ .
- b)  $(4, 3)$

**(Examen final, diciembre 2009)**

---

**VI.**— En  $\mathbb{R}^2$  y en una base orientada  $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ , tal que el módulo de  $\vec{e}_1$  es 1 y el de  $\vec{e}_2$  es  $\sqrt{2}$ . Hallar todas las transformaciones ortogonales que transforman el vector  $\vec{e}_1$  en el vector  $\frac{7}{5}\vec{e}_1 + \frac{4}{5}\vec{e}_2$ .

(Examen final, junio 2004)

---

**VII.**— En  $\mathbb{R}^3$  consideramos el producto escalar usual y la orientación determinada por la base canónica. Sea  $B$  una base de  $\mathbb{R}^3$  dada por:

$$B = \{(1, 1, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\},$$

y  $f$  el endomorfismo de  $\mathbb{R}_3$  cuya matriz asociada con respecto a la base  $B$  es:

$$\begin{pmatrix} 3/5 & 0 & -4/5 \\ -8/5 & -1 & 4/5 \\ 4/5 & 0 & 3/5 \end{pmatrix}$$

- (a) Probar que  $f$  es una transformación ortogonal.
- (b) Clasificar razonadamente  $f$ , indicando los subespacios de simetría y/o semieje y ángulo de giro.

(Examen final, diciembre 2005)

---

**VIII.**— Se considera un espacio vectorial euclídeo  $V$  de dimensión 3, con la orientación correspondiente a una base  $B$ . Determinar e interpretar geoméricamente todas las transformaciones ortogonales no diagonalizables definidas en  $V$  y cuya matriz en la base  $B$  tenga traza nula.

**IX.**— En  $\mathbb{R}^3$  con respecto al producto escalar usual y tomando como orientación positiva la dada por la base canónica hallar las ecuaciones de un giro que lleve el subespacio vectorial  $U$  en  $V$ .

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x + y - 4z = 0, y = 0\}, \quad V = \mathcal{L}\{(0, 1, 0)\}.$$

(Examen final, julio 2009)

---

**X.**— Determinar si el endomorfismo de  $\mathbb{R}^2$  cuya matriz respecto a un base ortonormal es:

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & \sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & -\cos(\alpha) \end{pmatrix}$$

es una transformación ortogonal. En caso afirmativo clasificarla, indicando, si es un giro, el correspondiente ángulo y si es una simetría, el correspondiente eje.

(Examen final, junio 2006)

---

**XI.**— En  $\mathbb{R}^3$  se consideran dos vectores independientes  $\vec{v}$  y  $\vec{u}$  que forman entre sí un ángulo  $\alpha$ . Demostrar que la composición de la simetría respecto del subespacio generado por  $\vec{v}$  y de la simetría respecto del subespacio generado por  $\vec{u}$  es un giro, indicando la dirección del eje y el ángulo.

(Segundo parcial, junio 2002)

---

**XII.**— Sea  $T$  la matriz asociada a una transformación ortogonal en una determinada base de un espacio vectorial euclídeo  $V$  de dimensión 3. Se sabe que  $\text{traza}(T) = 2$ . Justificar que se trata de un giro y dar el correspondiente ángulo del mismo.

(Examen extraordinario, diciembre 2007)

---