

Álgebra Lineal II

TEMA II- Espacios vectoriales euclídeos.

Capítulo 2. Ortogonalidad.

**Subespacios ortogonales. Suplementario ortogonal.
Proyecciones ortogonales.**

Luis Fuentes García (2022).



Subespacios ortogonales.

Trabajaremos en un **Espacio vectorial euclídeo** = Espacio vectorial U + **producto escalar**

Definición. Dos subespacios S, T se dicen **ortogonales** y se denota por $S \perp T$ si:

todo vector de S es ortogonal a todo vector de T





$$\forall \vec{u} \in S \quad \forall \vec{v} \in T \quad \vec{u} \perp \vec{v} \quad (\vec{u} \cdot \vec{v} = 0)$$

Ejemplos.

Con el **producto escalar usual.**

En el plano R^2 .

En el espacio R^3 .



¡OJO!. NO SON ORTOGONALES.

Hay **vectores** en uno de ellos que **NO** son **ortogonales** a **vectores** del otro.



Subespacios ortogonales.

Trabajaremos en un **Espacio vectorial euclídeo** = Espacio vectorial U + **producto escalar**

Definición. Dos subespacios S, T se dicen **ortogonales** y se denota por $S \perp T$ si:

todo vector de S es ortogonal a todo vector de T

$$\forall \vec{u} \in S \quad \forall \vec{v} \in T \quad \vec{u} \perp \vec{v} \quad (\vec{u} \cdot \vec{v} = 0)$$



Propiedad.

$$S \perp T \Rightarrow S \cap T = \{\vec{0}\}$$

Prueba:



$$\vec{u} \in S \cap T \Rightarrow \begin{cases} \vec{u} \in S \\ y \\ \vec{u} \in T \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{u} \perp \vec{u} \Rightarrow \vec{u} = \vec{0}$$



¡OJO!. NO SON ORTOGONALES.

Hay **vectores** en uno de ellos que **NO** son ortogonales a **vectores** del otro.



Subespacios ortogonales.

Trabajaremos en un **Espacio vectorial euclídeo** = Espacio vectorial U + **producto escalar**

Definición. Dos subespacios S, T se dicen **ortogonales** y se denota por $S \perp T$ si:

todo vector de S es ortogonal a todo vector de T

$$\forall \vec{u} \in S \quad \forall \vec{v} \in T \quad \vec{u} \perp \vec{v} \quad (\vec{u} \cdot \vec{v} = 0)$$

Propiedad.

Si $\begin{cases} S = L\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p\} \\ T = L\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_q\} \end{cases}$ entonces $S \perp T \Leftrightarrow \vec{u}_i \perp \vec{v}_j, \quad i = 1, 2, \dots, p, \quad j = 1, 2, \dots, q$

Prueba:



\Rightarrow Suponemos que $S \perp T \quad \vec{u}_i \in S \quad \vec{v}_j \in T \Rightarrow \vec{u}_i \perp \vec{v}_j$

\Leftarrow Suponemos que $\vec{u}_i \perp \vec{v}_j, \quad i = 1, 2, \dots, p, \quad j = 1, 2, \dots, q$

$$\vec{u} \in S \Rightarrow \vec{u} = a_1 \vec{u}_1 + a_2 \vec{u}_2 + \dots + a_p \vec{u}_p = \sum_{i=1}^p a_i \vec{u}_i$$

$$\vec{v} \in T \Rightarrow \vec{v} = b_1 \vec{v}_1 + b_2 \vec{v}_2 + \dots + b_q \vec{v}_q = \sum_{j=1}^q b_j \vec{v}_j$$




$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \left(\sum_{i=1}^p a_i \vec{u}_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^q b_j \vec{v}_j \right) = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q a_i b_j \vec{u}_i \cdot \vec{v}_j = 0 \Rightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$$



Subespacio suplementario ortogonal.

Definición. Dado un conjunto de vectores S se llama el **ortogonal** de S y denota por S^\perp a:

$$S^\perp = \{\text{vectores ortogonales a todos los de } S\} = \{\vec{v} \in U \mid \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \text{ para todo } \vec{u} \in S\}$$




EXACTAMENTE EL MISMO CONCEPTO YA VISTO.

Para **formas bilineales simétricas**: subespacio conjugado.

Para **producto escalar**: subespacio ortogonal.

Propiedades subespacio conjugado:

- 1) $conj(S)$ es un subespacio vectorial de U .
- 2) $S \subset T \Rightarrow conj(T) \subset conj(S)$
- 3) $conj(L(S)) = conj(S)$



Propiedades subespacio ortogonal:

- 1) S^\perp es un subespacio vectorial de U .
- 2) $S \subset T \Rightarrow T^\perp \subset S^\perp$
- 3) $(L(S))^\perp = S^\perp$
 $(L\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p\})^\perp = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p\}^\perp$



Subespacio suplementario ortogonal.

Definición. Dado un conjunto de vectores S se llama el **ortogonal** de S y denota por S^\perp a:

$$S^\perp = \{\text{vectores ortogonales a todos los de } S\} = \{\vec{v} \in U \mid \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \text{ para todo } \vec{u} \in S\}$$

4) Si U es un **espacio vectorial euclídeo** de dimensión n y S un **subespacio** entonces S y S^\perp son **suplementarios**.

Prueba:

$$\text{suplementarios} \Leftrightarrow \begin{cases} S \cap S^\perp = \{\vec{0}\} \\ S + S^\perp = U \end{cases}$$

$$S \cap S^\perp = \{\vec{0}\}$$

$$\vec{u} \in S \cap S^\perp \Rightarrow \begin{cases} \vec{u} \in S \\ \vec{u} \in S^\perp \end{cases} \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{u} = 0 \Rightarrow \vec{u} = \vec{0}$$

$$S + S^\perp = U$$

$\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p\}$ base ortogonal de S



$\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_p, \vec{u}_{p+1}, \vec{u}_{p+2}, \dots, \vec{u}_n\}$ base ortogonal de U


Teorema de la base ortogonal incompleta.

$n - p$ vectores

$$\vec{u}_j \perp \vec{u}_i \quad i = 1, 2, \dots, p \quad j = 1, 2, \dots, q$$

$$L\{\vec{u}_{p+1}, \vec{u}_{p+2}, \dots, \vec{u}_n\} \subset S^\perp \Rightarrow \dim(S^\perp) \geq n - p$$

$$\textcircled{n} = \dim(U) \stackrel{=}{\geq} \dim(S + S^\perp) = \dim(S) + \dim(S^\perp) - \dim(S \cap S^\perp) \stackrel{=}{\geq} p + (n - p) - 0 = \textcircled{n} \Rightarrow \dim(S + S^\perp) = \dim(U)$$



Ejemplo. En \mathbb{R}^3 con el producto escalar

$$G_C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

i) calcular la matriz asociada a la proyección ortogonal sobre $S = L\{(1, 0, 0)\}$.

ii) calcular la proyección ortogonal de $(1, 2, -1)$ sobre S .

Matriz asociada:

1) $B = \{\underbrace{\vec{s}_1, \dots, \vec{s}_p}_S, \underbrace{\vec{t}_1, \dots, \vec{t}_q}_{S^\perp}\}$

2) $P_B = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \dots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \dots & 0 \end{pmatrix}$

3) Cambio de base:

$$P_C = M_{CB} P_B M_{CB}^{-1}$$

Calculamos S^\perp :

$$S^\perp = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y, z) \cdot (1, 0, 0) = 0\} = L\{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\}$$

$$(x, y, z) \cdot (1, 0, 0) = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

Implícita.

$$x + y + z = 0$$

Paramétricas. Generadores

$$z = -x - y \Rightarrow \begin{cases} x = \alpha \\ y = \beta \\ z = -\alpha - \beta \end{cases}$$

1) $B = \{\underbrace{(1, 0, 0)}_S, \underbrace{(1, 0, -1), (0, 1, -1)}_{S^\perp}\}$ base de U

2) $P_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

3) Cambio de base:

$$P_C = M_{CB} P_B M_{CB}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = P_C$$

Proyección ortogonal de $(1, 2, -1)$ sobre S :

$$P_C \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$p(1, 2, -1) = (2, 0, 0)$$

