

- 1.— En el conjunto de las matrices $n \times n$ de elementos reales, demostrar que el producto de matrices triangulares inferiores es otra matriz triangular inferior.

Sean A y B dos matrices triangulares inferiores. Verifican $a_{ij} = b_{ij} = 0$ cuando $i < j$. Queremos ver que $C = AB$ es triangular inferior. Para ello hay que comprobar que $c_{ij} = 0$ cuando $i < j$.

Sea $i < j$; por la definición de producto de matrices, el término c_{ij} es:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

Separamos esta sumatorio en dos:

$$c_{ij} = \left(\sum_{k=1}^i a_{ik}b_{kj} \right) + \left(\sum_{k=i+1}^n a_{ik}b_{kj} \right)$$

En el primer sumatorio $k \leq i < j$ y como B es triangular inferior, entonces $b_{kj} = 0$. Vemos que este primer sumando es 0. En el segundo sumatorio $i < k$ y como A es triangular inferior, entonces $a_{ik} = 0$. Por tanto este segundo sumando es también cero. Deducimos que $c_{ij} = 0$ para cualquier $i < j$ y así, $C = AB$ es triangular inferior.

(Primer parcial, febrero 2000)

- 2.— Sea A una matriz diagonal $n \times n$ y supongamos que todos los elementos de su diagonal son distintos entre sí. Demostrar que cualquier matriz $n \times n$ que conmute con A ha de ser diagonal.

(Examen final, junio 2002)

Sea B una matriz que conmute con A , es decir, $AB = BA$. Queremos ver que B es diagonal, es decir, $b_{ij} = 0$ si $i \neq j$.

Comparemos los términos de las matrices AB y BA . El término en la fila i y columna j de AB es:

$$\sum_{k=0}^n a_{ik}b_{kj} = a_{ii}b_{ij}$$

ya que los términos a_{ik} con $i \neq k$ se anulan, por ser A diagonal. Por otra parte el término en la fila i y columna j de BA es:

$$\sum_{k=0}^n b_{ik}a_{kj} = b_{ij}a_{jj}$$

donde de nuevo los términos a_{kj} con $k \neq j$ se anulan.

Como $AB = BA$, entonces $a_{ii}b_{ij} = a_{jj}b_{ij}$ y $(a_{ii} - a_{jj})b_{ij} = 0$. Si $i \neq j$, entonces $a_{ii} - a_{jj} \neq 0$, porque habíamos supuesto que los términos de la diagonal de A son todos diferentes. Por tanto $b_{ij} = 0$ si $i \neq j$ y concluimos que B es una matriz diagonal.

7.— Dada la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} x & x+1 & x+2 \\ x+3 & x+2 & x+1 \\ x+2 & x & x+4 \end{pmatrix}$$

(i) Hallar x para que $\det(A) = 0$.

Hacemos operaciones elementales que conservan el rango y el determinante. Comenzamos restando la primera fila a las demás:

$$\begin{pmatrix} x & x+1 & x+2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Restamos la primera columna a las otras dos:

$$\begin{pmatrix} x & 1 & 2 \\ 3 & -2 & -4 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

Finalmente a la primera fila le sumamos la mitad de la segunda:

$$\begin{pmatrix} x+3/2 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & -4 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

Desarrollando por la primera fila el determinante queda:

$$\det(A) = (x + \frac{3}{2}) \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} = -12(x + \frac{3}{2})$$

Deducimos que $\det(A) = 0$ si y sólo si $x = -3/2$.

(ii) Estudiar el rango de A en función de los valores de x .

Si $x = 3/2$ el determinante es nulo. En ese caso además vimos que el menor formado por las dos últimas filas y columnas de la matriz:

$$\begin{pmatrix} x+3/2 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & -4 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

tiene determinante no nulo. Por tanto el rango es 2.

Si $x \neq 3/2$ el determinante es no nulo y así la matriz tiene rango 3.

8.— Sea $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ cumpliendo $A^4 = A$. Analizar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

(i) $A^3 = Id$.

FALSO. Por ejemplo si $A = 0$, cumple $A^4 = 0 = A$, pero $A^3 = 0 \neq Id$.

(ii) $A^{34} = A$.

VERDADERO:

$$A^{34} = A^{32+2} = A^{32}A^2 = (A^4)^8A^2 = A^8A^2 = (A^4)^2A^2 = A^2A^2 = A^4 = A.$$

(iii) Si A es inversible, entonces $\det(A) = 1$.

VERDADERO. Si $A^4 = A$, aplicando determinantes:

$$\det(A^4) = \det(A) \Rightarrow \det(A)^4 = \det(A) \Rightarrow \det(A)^4 - \det(A) = 0 \Rightarrow \det(A)(\det(A)^3 - 1) = 0.$$

Si A es inversible entonces $\det(A) \neq 0$. Por tanto simplificando queda:

$$\det(A)^3 - 1 = 0 \Rightarrow \det(A)^3 = 1 \Rightarrow \det(A) = 1.$$

(iv) Puede ocurrir que $A^2 = A$.

VERDADERO. Basta considerar por ejemplo $A = 0$. Cumple $A^4 = A$ y también $A^2 = A$.

9.— Sean $A, B \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$. Razonar la falsedad o veracidad de las siguientes afirmaciones:

(i) Si $\text{rango}(A) = 1$ entonces $\text{rango}(AB) \leq 1$.

VERDADERO. Como $\text{rango}(A) = 1$ y $A \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ se tiene que $\det(A) = 0$. Entonces:

$$\det(AB) = \det(A)\det(B) = 0 \cdot \det(B) = 0$$

y así $\text{rango}(AB) < 2$, es decir, $\text{rango}(AB) \leq 1$.

(ii) Si $\text{rango}(A) = \text{rango}(B)$ entonces $\text{rango}(AB) = \text{rango}(A)$.

FALSO. Por ejemplo si $A = B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ entonces $\text{rango}(AB) = \text{rango}(0) = 0 \neq 1 = \text{rango}(A)$.

(iii) $\text{rango}(A) + \text{rango}(B) = \text{rango}(A + B)$.

FALSO. Por ejemplo si $A = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ entonces $\text{rango}(A) + \text{rango}(B) = 2 + 2 = 4$ pero $\text{rango}(A + B) = 2$.

(iv) $\text{rango}(A) + \text{rango}(B) > \text{rango}(A + B)$.

FALSO. Por ejemplo si $A = B = 0$ entonces $\text{rango}(A) + \text{rango}(B) = 0 = \text{rango}(A + B)$.

(1.2 puntos)

10.— Sean $A, B, C \in \mathcal{M}_{6 \times 6}(\mathbb{R})$ matrices verificando $-ABA^t = CA + A$, $\det(B) = 1$, A inversible. Sabiendo que C es una matriz diagonal con $c_{ii} = i$, calcular $\det(A)$.

Partimos de la expresión dada:

$$-ABA^t = CA + A \Rightarrow -ABA^t = (C + Id)A$$

Aplicamos determinantes a ambos lados:

$$\det(-ABA^t) = \det((C + Id)A)$$

Usamos que $\det(kX) = k^n \det(X)$ si X es de tamaño $n \times n$; además que el determinante del producto es el producto de determinantes y que el determinante de la traspuesta coincide con el determinante de la matriz de partida:

$$\begin{aligned} (-1)^6 \det(ABA^t) &= \det(C + Id)\det(A) \Rightarrow \det(A)\det(B)\det(A^t) = \det(C + Id)\det(A) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \det(A)^2 \det(B) = \det(C + Id)\det(A). \end{aligned}$$

Cómo A es inversible, $\det(A) \neq 0$ y podemos simplificar:

$$\det(A)\det(B) = \det(C + Id)$$

Como $\det(B) = 1$:

$$\det(A) = \det(C + Id).$$

Para hallar $\det(C + Id)$ tenemos en cuenta que es una matriz diagonal por ser suma de matrices diagonales. Por tanto su determinante es el producto de los términos de la diagonal:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det(C + Id) = (c_{11} + 1)(c_{22} + 1)(c_{33} + 1)(c_{44} + 1)(c_{55} + 1)(c_{66} + 1) = \\ &= (1 + 1)(2 + 1)(3 + 1)(4 + 1)(5 + 1)(6 + 1) = 7! = 5040. \end{aligned}$$

16.— Sea $n > 2$ y $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$, una matriz inversible. Sea $\text{adj}(A)$ su matriz adjunta. Probar que:

(a) $\det(\text{adj}(A)) = \det(A)^{n-1}$.

Sabemos que:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A).$$

De donde:

$$\text{adj}(A) = \det(A) \cdot A^{-1}.$$

Aplicando determinantes queda:

$$\det(\text{adj}(A)) = \det(\det(A) \cdot A^{-1}) = \det(A)^n \det(A^{-1}) = \frac{\det(A)^n}{\det(A)} = \det(A)^{n-1}.$$

(b) $\text{adj}(\text{adj}(A)) = \det(A)^{n-2} \cdot A$.

Como antes sabemos que:

$$\text{adj}(A) = \det(A) \cdot A^{-1}.$$

Entonces:

$$\text{adj}(\text{adj}(A)) = \det(\text{adj}(A)) \cdot \text{adj}(A)^{-1} = \det(A)^{n-1} \cdot (\det(A) \cdot A^{-1})^{-1} = \det(A)^{n-1} \cdot \det(A)^{-1} \cdot A = \det(A)^{n-2} \cdot A.$$

I.— En el conjunto de las matrices $n \times n$ de elementos reales, demostrar que si $AA^T = \Omega$, entonces $A = \Omega$.

Llamemos $B = A^T$. Entonces por definición de traspuesta, $b_{ij} = a_{ji}$. Ahora por hipótesis $\Omega = AA^t = AB$. Haciendo el producto vemos que para cualquier i, j con, $1 \leq i, j \leq n$:

$$0 = \sum_{k=0}^n a_{ik}b_{kj} = \sum_{k=0}^n a_{ik}a_{jk}$$

En particular, si $i = j$:

$$0 = \sum_{k=0}^n a_{ik}a_{ik} = \sum_{k=0}^n a_{ik}^2$$

Por ser A una matriz con coeficientes reales, los cuadrados a_{ik}^2 son siempre números no negativos. Si su suma es cero, todos ellos han de ser cero, y deducimos que $a_{ik} = 0$ para cualquier i, k con, $1 \leq i, k \leq n$. Por tanto $A = \Omega$.

(Primer parcial, febrero 2000)

II.— Calcular las potencias n -simas de las siguientes matrices:

El método (*¡de momento!*) más usual es hacer "a mano" las primeras potencias y luego encontrar una regla general:

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Calculamos las primeras potencias

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 27 & 0 \\ 6 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 81 & 0 \\ 8 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \dots$$

Parece razonable pensar que, en general:

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3^n & 0 \\ 2n & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Hay que comprobarlo. Se hace por inducción. Para ello:

- Vemos que se cumple para A^1 .
- Comprobamos que, si suponemos cierta la fórmula para $n - 1$, entonces se cumple para n , es decir:

$$A^n = A \cdot A^{n-1} = A \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3^{n-1} & 0 \\ 2(n-1) & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3^n & 0 \\ 2n & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

Calculamos las primeras potencias:

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^3 = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}, \quad B^4 = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} = (-4)Id$$

Ahora es fácil continuar porque:

$$B^5 = B \cdot B^4 = (-4)B; \quad B^6 = (-4)B^2; \quad B^7 = (-4)B^3; \quad B^8 = (-4)^2 Id; \quad \dots$$

En general, el exponente n siempre lo podemos escribir como $n = 4d + r$ donde r es el resto de dividir n entre 4 y por tanto es un número entero comprendido entre 0 y 3. Tendremos:

$$B^n = B^{4d+r} = (B^4)^d \cdot B^r = (-4)^d Id \cdot B^r = (-4)^d B^r$$

En definitiva escribimos el resultado dependiendo de los 4 posibles valores de r :

$$B^n = (-4)^d \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{si } n = 4d;$$

$$B^n = (-4)^d \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{si } n = 4d + 1;$$

$$B^n = (-4)^d \cdot \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{si } n = 4d + 2;$$

$$B^n = (-4)^d \cdot \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}, \quad \text{si } n = 4d + 3;$$

(c) $C = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \\ c & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Hacemos las primeras potencias:

$$C^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & ab \\ bc & 0 & 0 \\ 0 & ac & 0 \end{pmatrix}, \quad C^3 = \begin{pmatrix} abc & 0 & 0 \\ 0 & abc & 0 \\ 0 & 0 & abc \end{pmatrix} = abc \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Paramos en la tercera potencia. Nos fijamos que $C^3 = abcId$. Ahora es muy fácil multiplicar por C^3 . Podemos en general hacer lo siguiente. Dado $n > 0$, sabemos que $n = 3q + r$, donde q es el cociente y $r < 3$ es el resto de dividir n por 3. Por tanto:

$$C^n = C^{3q+r} = (C^3)^q C^r = (abcI)^q C^r = a^q b^q c^q C^r$$

y,

$$C^n = \begin{pmatrix} a^q b^q c^q & 0 & 0 \\ 0 & a^q b^q c^q & 0 \\ 0 & 0 & a^q b^q c^q \end{pmatrix}, \quad \text{si } n = 3q;$$

$$C^n = \begin{pmatrix} 0 & a^{q+1} b^q c^q & 0 \\ 0 & 0 & a^q + b^{q+1} c^q \\ a^q b^q c^{q+1} & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{si } n = 3q + 1;$$

$$C^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a^{q+1} b^{q+1} c^q \\ a^q b^{q+1} c^{q+1} & 0 & 0 \\ 0 & a^{q+1} b^q c^{q+1} & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{si } n = 3q + 2.$$

(d) $D = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix}$. Hacemos las primeras potencias:

$$D^2 = \begin{pmatrix} a^4 + a^2b^2 + a^2c^2 & a^3b + ab^3 + abc^2 & a^3c + ab^2c + ac^3 \\ a^3b + ab^3 + abc^2 & a^2b^2 + b^4 + b^2c^2 & a^2bc + b^3c + bc^3 \\ a^3c + ab^2c + ac^3 & a^2bc + b^3c + bc^3 & a^2c^2 + b^2c^2 + c^4 \end{pmatrix} = (a^2 + b^2 + c^2)D$$

Ahora es fácil seguir haciendo las potencias de D , porque:

$$\begin{aligned} D^3 &= D^2D = (a^2 + b^2 + c^2)D^2 = (a^2 + b^2 + c^2)^2D \\ D^4 &= D^3D = (a^2 + b^2 + c^2)^2D^2 = (a^2 + b^2 + c^2)^3D \\ &\dots \end{aligned}$$

En general vemos que;

$$D^n = (a^2 + b^2 + c^2)^{n-1}D$$

De nuevo hay que comprobarlo por inducción:

- Para $n = 1$ es cierto, ya que $D^1 = (a^2 + b^2 + c^2)^{1-1}D = D$.

- Lo suponemos cierto para $n - 1$ y lo probamos para n :

$$\begin{aligned} D^n &= D^{n-1} \cdot D = (a^2 + b^2 + c^2)^{n-2}D \cdot D = (a^2 + b^2 + c^2)^{n-2}D^2 = \\ &= (a^2 + b^2 + c^2)^{n-2}(a^2 + b^2 + c^2)D = (a^2 + b^2 + c^2)^{n-1}D. \end{aligned}$$

III.— Para las siguientes familias de matrices no singulares de $\mathcal{M}_{n \times n}(K)$, decidir si verifican alguna de las dos condiciones: (a) dada una matriz de la familia, su inversa también pertenece a la familia; (b) dadas dos matrices de la familia, su producto también pertenece a la familia.

(1) las matrices simétricas regulares,

(a) CIERTO. Que sea regular simplemente significa que tiene inversa. Y una matriz simétrica es aquella que coincide con su traspuesta.

Hay que probar que si una matriz es simétrica su inversa es también simétrica.

Basta usar las propiedades de la trasposición: $(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$ pero por ser A simétrica $A^t = A$, luego $(A^{-1})^t = A^{-1}$ y por tanto la inversa es simétrica.

(b) FALSO. Dadas A, B simétricas, veamos si lo es AB . Tenemos $(AB)^t = B^t A^t$; por ser A, B simétricas deducimos que $(AB)^t = BA$. Teniendo en cuenta que el producto de matrices no es conmutativo, en general $BA \neq AB$ y por tanto AB no tiene porque ser simétrica. Veamos un ejemplo del de dos matrices simétricas cuyo prdoducto NO lo es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad AB = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) las matrices regulares que conmutan con una matriz dada $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(K)$,

(a) CIERTO. Supongamos que una matriz regular B conmuta con A . Veamos que también conmuta su inversa. Por conmutar A y B se tiene $AB = BA$. Multiplicando ambos términos, por la derecha y por la izquierda por B^{-1} tenemos, $B^{-1}ABB^{-1} = B^{-1}BAB^{-1}$. Y como $BB^{-1} = B^{-1}B = I$ queda, $B^{-1}A = AB^{-1}$.

(b) CIERTO. Supongamos que B y C conmutan con A . Veamos que entonces BC también conmuta con A :

$$(BC)A = B(CA) = B(AC) = (BA)C = A(BC)$$

(3) *las matrices ortogonales.*

Una matriz ortogonal es aquella cuya inversa es igual a su traspuesta.

(a) CIERTO. Sea A ortogonal ($A^t = A^{-1}$). Veamos que A^{-1} es ortogonal:

$$(A^{-1})^t = (A^t)^{-1} = (A^{-1})^{-1}$$

Vemos que su traspuesta coincide con su inversa y es ortogonal.

(b) CIERTO. Sean A, B ortogonales. Veamos que AB es ortogonal.

$$(AB)^t = B^t A^t = B^{-1} A^{-1} = (AB)^{-1}$$

Luego vemos que su inversa coincide con su traspuesta.

IV.— Sea A una matriz columna de orden $n \times 1$ tal que $A^t A = 1$ y $B = Id_n - 2AA^t$. Demostrar que:

a) B es simétrica

Hay que comprobar que $B^t = B$. Pero:

$$B^t = (Id_n - 2AA^t)^t = Id_n^t - 2(AA^t)^t = Id_n - 2(A^t)^t A^t = Id_n - 2AA^t = B.$$

b) $B^{-1} = B^t$

Ahora veamos que $BB^t = Id$. Como $B^t = B$ tenemos:

$$BB^t = BB = (Id_n - 2AA^t)(Id_n - 2AA^t) = Id_n - 4AA^t + 4AA^t AA^t.$$

Ahora usamos que $A^t A = 1$:

$$BB^t = Id_n - 4AA^t + 4A \underbrace{(A^t A)}_1 A^t = Id_n - 4AA^t + 4AA^t = Id_n.$$

(Primer parcial, enero 2008)

V.— Para cada $n \in \mathbb{N}$ se define la matriz $A_n \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ como:

$$a_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } i = j \\ i & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

(i) Escribir explícitamente la matriz A_4 .

$$A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 0 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

(ii) Calcular $\det(A_4)$.

Según la fórmula que veremos en el apartado siguiente:

$$\det(A_4) = 4!(4-1)(-1)^{4-1} = -72.$$

(iii) Para $n \geq 2$, calcular traza A_n , $\det(A_n)$ y rango(A_n).

Tenemos:

$$A_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & \dots & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 0 & \dots & 3 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n-1 & n-1 & n-1 & \dots & 0 & n-1 \\ n & n & n & \dots & n & 0 \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$\text{traza}(A_n) = 0 + 0 + 0 + \dots + 0 + 0 = 0.$$

Para calcular el determinante comenzamos sacando en cada fila un factor común: 2 en la segunda fila, 3 en la tercera, 4 en la cuarta, etcetera...

$$|A_n| = 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Continuamos sumando todas las filas a la primera y después sacando factor común a $n-1$:

$$|A_n| = n! \begin{vmatrix} n-1 & n-1 & n-1 & \dots & n-1 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix} = n!(n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Restamos ahora la primera fila a las demás y concluimos:

$$|A_n| = n!(n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -1 \end{vmatrix} = n!(n-1)(-1)^{n-1}.$$

Para $n > 1$ vemos que el determinante es no nulo y por tanto $\text{rango}(A_n) = n$. Para $n = 1$, $A_1 = (0)$ y su rango es 0.

VI.— Sea X una matriz cuadrada de tamaño $n \times n$ y elementos reales. Sea k un número par. Probar que si $X^k = -Id$, entonces n es también un número par.

Si se cumple que $X^k = -Id$, aplicando determinantes obtenemos que

$$\det(X^k) = \det(-Id).$$

Pero $\det(X^k) = \det(X)^k$ y $\det(-Id) = (-1)^n$. Por tanto:

$$\det(X)^k = (-1)^n$$

Como k es par, $\det(X)^k$ es positivo; entonces $(-1)^n$ ha de ser positivo y en consecuencia n tiene que ser un número par.

VII.— Dada la matriz $m \times n$ con $m, n > 1$,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n-1 & n \\ n+1 & n+2 & \dots & 2n-1 & 2n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ (m-1)n+1 & (m-1)n+2 & \dots & mn-1 & mn \end{pmatrix}$$

expresar a_{ij} en función de i y j , y calcular su rango.

El término a_{ij} es de la forma:

$$a_{ij} = j + (i-1) \cdot n$$

Para hallar el rango hacemos operaciones fila y columna sobre la matriz A .

Le restamos la primera fila a todas las demás:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n-1 & n \\ n & n & \dots & n & n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ (m-1)n & (m-1)n & \dots & (m-1)n & (m-1)n \end{pmatrix}$$

Ahora le restamos la primera columna a todas las demás:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & n-2 & n-1 \\ n & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ (m-1)n & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vemos que las filas $3, \dots, m$ son proporcionales a la segunda. Por tanto el rango es a lo sumo 2. Para ver que el rango es exactamente 2 basta mostrar un menor 2×2 de determinante no nulo:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ n & 0 \end{vmatrix} = -n.$$

VIII.— Dados $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 0$ y la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & x & x \\ 1 & x & 0 & x \\ 1 & x & x & 0 \end{pmatrix},$$

calcular $\det(A^3)$ y $\det(A^{-1})$.

Por las propiedades del determinante:

$$\det(A^3) = \det(A)^3$$

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

por lo que nuestro problema se reduce a calcular el $\det(A)$:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & x & x \\ 0 & x & -x & 0 \\ 0 & x & 0 & -x \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & -x & 0 \\ x & 0 & -x \end{pmatrix} = \\ &= -\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & -2x & -x \\ x & -x & -2x \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} -2x & -x \\ -x & -2x \end{pmatrix} = -(4x^2 - x^2) = -3x^2. \end{aligned}$$

y en definitiva:

$$\det(A^3) = (-3x^2)^3 = -27x^6, \quad \det(A^{-1}) = -\frac{1}{3x^2}.$$

IX.— Dados $n \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{R}$ se considera la matriz $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{pmatrix} a+b & a & a & \dots & a & a \\ a & a+b & a & \dots & a & a \\ a & a & a+b & \dots & a & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a & a & a & \dots & a+b & a \\ a & a & a & \dots & a & a+b \end{pmatrix}$$

- (i) Hallar $\det(A)$ en función de a, b, n .
(ii) Hallar $\text{rango}(A)$ en función de a, b, n .

Comenzamos haciendo operaciones elementales fila que conservan en rango y el determinante.

Restamos la primera columna a todas las demás:

$$\begin{pmatrix} a+b & -b & -b & \dots & -b & -b \\ a & b & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a & 0 & b & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a & 0 & 0 & \dots & b & 0 \\ a & 0 & 0 & \dots & 0 & b \end{pmatrix}$$

Sumamos a la primera fila todas las demás:

$$\begin{pmatrix} na+b & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a & b & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a & 0 & b & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a & 0 & 0 & \dots & b & 0 \\ a & 0 & 0 & \dots & 0 & b \end{pmatrix}$$

La matriz es triangular. Por tanto su determinante es el producto de los términos de la diagonal:

$$\det(A) = (na + b)b^{n-1}.$$

El rango (dado que está escalonada por columnas) es el número de columna no nulas.

- Si $b = 0$ y $a = 0$, la matriz es la matriz nula. Por tanto $\text{rango}(A) = 0$.

- Si $b = 0$ y $a \neq 0$, todas las columnas (de la forma escalonada) excepto la primera son nulas. Por tanto $\text{rango}(A) = 1$.

- Si $b \neq 0$, las $n - 1$ últimas columnas son no nulas. El rango es al menos $n - 1$. La primera columna será nula dependiendo de si $an + b = 0$. Deducimos:

- Si $b \neq 0$ y $a = -b/n$ entonces $\text{rango}(A) = n - 1$.

- Si $b \neq 0$ y $a \neq -b/n$ entonces $\text{rango}(A) = n$.

X.— Hallar el siguiente determinante para $n \geq 2$

$$A_n = \begin{vmatrix} x_1 + y_1 & x_1 + y_2 & x_1 + y_3 & \dots & x_1 + y_n \\ x_2 + y_1 & x_2 + y_2 & x_2 + y_3 & \dots & x_2 + y_n \\ x_3 + y_1 & x_3 + y_2 & x_3 + y_3 & \dots & x_3 + y_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n + y_1 & x_n + y_2 & x_n + y_3 & \dots & x_n + y_n \end{vmatrix}$$

Restamos a las filas 2, 3, ..., n la primera fila. Queda:

$$A_n = \begin{vmatrix} x_1 + y_1 & x_1 + y_2 & x_1 - x_1 & \cdots & x_1 - x_1 \\ x_2 - x_1 & x_2 - x_1 & x_2 - x_1 & \cdots & x_2 - x_1 \\ x_3 - x_1 & x_3 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_3 - x_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n - x_1 & x_n - x_1 & x_n - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \end{vmatrix}$$

Vemos que en cada fila 2, 3, ..., n los términos son iguales. Por las propiedades del determinante, podemos sacarlos fuera:

$$A_n = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} x_1 + y_1 & x_1 + y_2 & x_1 - x_1 & \cdots & x_1 - x_1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

Entonces si $n > 2$, hay dos o más filas iguales y por tanto el determinante es 0.

Si $n = 2$ queda:

$$A_2 = (x_2 - x_1) \begin{vmatrix} x_1 + y_1 & x_1 + y_2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (x_2 - x_1)(y_1 - y_2)$$

(Primer parcial, febrero 2003)

XI.— Calcular en función de x el siguiente determinante:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 & 1 \\ x & x^2 & 1 & 1 \\ x^2 & 1 & 1 & x \\ 1 & 1 & x & x^2 \end{pmatrix}$$

¿Para qué valores reales de x se anula?

Hacemos operaciones elementales para simplificar el determinante. Comenzamos sumando todas las fila a la primera:

$$\begin{aligned} & \det \begin{pmatrix} 2 + x + x^2 & 2 + x + x^2 & 2 + x + x^2 & 2 + x + x^2 \\ x & x^2 & 1 & 1 \\ x^2 & 1 & 1 & x \\ 1 & 1 & x & x^2 \end{pmatrix} = \\ & = (2 + x + x^2) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & x^2 & 1 & 1 \\ x^2 & 1 & 1 & x \\ 1 & 1 & x & x^2 \end{pmatrix} = \\ & = (2 + x + x^2) \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ x & x^2 - x & 1 - x & 1 - x \\ x^2 & 1 - x^2 & 1 - x^2 & x - x^2 \\ 1 & 0 & x - 1 & x^2 - 1 \end{pmatrix} = \\ & = (2 + x + x^2) \det \begin{pmatrix} x^2 - x & 1 - x & 1 - x \\ 1 - x^2 & 1 - x^2 & x - x^2 \\ 0 & x - 1 & x^2 - 1 \end{pmatrix} = \\ & = (2 + x + x^2)(x - 1)^3 \det \begin{pmatrix} x & -1 & -1 \\ -1 - x & -1 - x & -x \\ 0 & 1 & x + 1 \end{pmatrix} = \\ & = (2 + x + x^2)(x - 1)^3 \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 - x - x^2 & -1 & -x \\ x^2 + x & -x & x + 1 \end{pmatrix} = \\ & = -(2 + x + x^2)(x - 1)^3 \det \begin{pmatrix} -1 - x - x^2 & -1 \\ x^2 + x & -x \end{pmatrix} = -(2 + x + x^2)(x - 1)^3 x(x^2 + 2x + 2) \end{aligned}$$

El determinante se anula en las raíces de cada factor:

$$2 + x + x^2 = 0 \iff x = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} \notin \mathbb{R}$$

$$x - 1 = 0 \iff x = 1$$

$$x = 0$$

$$x^2 + 2x + 2 = 0 \iff x = -1 \pm \sqrt{1-2} \notin \mathbb{R}$$

Es decir se anula para $x = 0$ ó $x = 1$.

XII.— Para cada número natural n se define una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ como:

$$a_{ij} = i^2 + j, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

(i) Escribir la matriz A para $n = 4$ y calcular su determinante.

La matriz para $n = 4$ es:

$$\begin{pmatrix} 1^2 + 1 & 1^2 + 2 & 1^2 + 3 & 1^2 + 4 \\ 2^2 + 1 & 2^2 + 2 & 2^2 + 3 & 2^2 + 4 \\ 3^2 + 1 & 3^2 + 2 & 3^2 + 3 & 3^2 + 4 \\ 4^2 + 1 & 4^2 + 2 & 4^2 + 3 & 4^2 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 10 & 11 & 12 & 13 \\ 17 & 18 & 19 & 20 \end{pmatrix}$$

Como veremos y probaremos en el apartado siguiente su determinante es cero.

(ii) Calcular el rango y el determinante de A para cualquier natural n .

Para $n = 1$ la matriz es $A = (1^2 + 1) = (2)$, su determinante es 2 (no nulo) y por tanto el rango el máximo posible 1.

Para $n = 2$ la matriz es $A = \begin{pmatrix} 1^2 + 1 & 1^2 + 2 \\ 2^2 + 1 & 2^2 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$. Su determinante es $2 \cdot 6 - 3 \cdot 4 = -3$ no nulo; por tanto el rango es 2.

Veamos el caso general para $n > 2$. Haremos operaciones elementales fila y columna que conservan el rango y determinante. La matriz en general es:

$$\begin{pmatrix} 1^2 + 1 & 1^2 + 2 & 1^2 + 3 & \dots & 1^2 + n - 1 & 1^2 + n \\ 2^2 + 1 & 2^2 + 2 & 2^2 + 3 & \dots & 2^2 + n - 1 & 2^2 + n \\ 3^2 + 1 & 3^2 + 2 & 3^2 + 3 & \dots & 3^2 + n - 1 & 3^2 + n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ (n-1)^2 + 1 & (n-1)^2 + 2 & (n-1)^2 + 3 & \dots & (n-1)^2 + n - 1 & (n-1)^2 + n \\ n^2 + 1 & n^2 + 2 & n^2 + 3 & \dots & n^2 + n - 1 & n^2 + n \end{pmatrix}$$

Restamos a cada columna la anterior:

$$\begin{pmatrix} 1^2 + 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 2^2 + 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 3^2 + 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ (n-1)^2 + 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ n^2 + 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Restamos la segunda columna a la tercera, cuarta y siguientes:

$$\begin{pmatrix} 1^2 + 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 2^2 + 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 3^2 + 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ (n-1)^2 + 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ n^2 + 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Como tiene una columna de ceros el determinante es nulo. Además sólo hay dos columnas no nulas, luego el rango a lo sumo es 2. En particular el menor formado por las dos primeras filas y columnas tiene determinante $2 - 5 = -3 \neq 0$, por tanto el rango es exactamente 2.

Es decir si $n \neq 3$, $\text{rango}(A) = 2$ y $\det(A) = 0$.
